



Fast 1,8[®]



Insecticida - Acaricida

Para que los insectos no *Fastidien* sus cultivos





En Gleba trabajamos para brindarle soluciones eficientes y de alta calidad

Fast 1,8[®]

Abamectina 1,8% ec

- Poder residual
- Amplio espectro
- Gran variedad de cultivos
- Calidad asegurada



Principales recomendaciones de uso

| CULTIVO | PLAGA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|----------|--|--|--|
| Cítricos | Acaro de tostado (<i>Phyllocoptura oleivora</i>) Acaro blanco (<i>Hemitarsonemus latus</i>) | 15-20 cm ³ / 100 l de agua + 0,25% de aceite mineral de verano | Después de floración, cuando observe los primeros ácaros sobre frutos pequeños formados (menos de 2 cm de diámetro). Repetir cuando sea necesario. |
| | Acaro de la yema (<i>Aceria sheldoni</i>) | 20 cm ³ / 100 l de agua + 0,25-0,50 % de aceite mineral de verano | Al hincharse las yemas. No aplicar durante la floración. |
| Algodón | Oruga del algodonero (<i>Alabama argillacea</i>) | 300-600 cm ³ /ha | Con la presencia de 50 o más orugas en 100 golpes de red de arrastre. Controlar las larvas en su primer estado de desarrollo. |
| | Arañuela roja (<i>Tetranychus telarius</i>) | | Al notar la presencia de las primeras arañuelas o los primeros síntomas del ataque de ácaros. Repetir cuando ocurran reinfestaciones. |
| Pimiento | Arañuela roja común (<i>Tetranychus telarius</i>) | 50-70 cm ³ /100 l de agua | Al primer indicio de arañuelas. Repetir cuando sea necesario. |
| Tomate | Arañuela roja común (<i>Tetranychus telarius</i>) | 50-70 cm ³ /100 l de agua | Al primer indicio de infestación. Repetir cuando sea necesario. |
| | Acaro del bronceado (<i>Aculops lycopersici</i>) | 60-70 cm ³ /100 l de agua | |

www.gleba.com.ar

Avda. 520 N^o 9497
(1903) Melchor Romero
La Plata - Prov. de Buenos Aires
Teléfono: (0221) 491-3062
Fax directo: (0221) 491-6093